

乳児期のステロイド使用後に 3 日ほどで頭部湿疹が改善した乳児アトピーの経過 (1 歳 幼児)

症例 ID：001-01-MN | 記録日：記録日不明

1. 診断・治療前経過

生後 2～3 か月頃から頭や体に湿疹が出て、小児科でアトピーと診断され、ステロイド外用薬を処方されました。外用すると一時的に治まりましたが、中止すると再び悪化する状態を繰り返しました。

2. ステロイド使用歴

項目	内容
使用内容	乳児期にステロイド外用薬を使用しました。
製品名	不明です。
強度	不明です。
使用期間	短期間の使用と考えられますが詳細は不明です。
中止時期	松本医院での治療開始時期です。
来院前／後	来院前に使用歴があります。来院後は使用していません。

3. 治療開始後の経過（リバウンドを含む）

時期	治療開始から	経過
生後 2～3 か月頃	発症	頭や体に湿疹が出ました。
小児科受診後	外用治療	ステロイド外用で一時的に治まりましたが、中止すると再発しました。
松本医院受診後	治療開始	傷部位の消毒と漢方薬の入浴を開始しました。
治療 3 日ほど	変化	頭にできていた湿疹がきれいになりました。
記録時点	経過後	皮膚はきれいな状態となっていました。

4. ピーク時期

ピークは、小児科受診前後に頭や体の湿疹が出て、外用中止後に再発を繰り返した時期です。

5. 困りごと

- 乳児期の湿疹が頭や体に出ていました。
- 外用すると一時的に治まり、中止すると再発する状態を繰り返しました。

6. 経過のまとめ

松本医院での治療開始後、3 日ほどで頭部湿疹はきれいになりました。

本ページは、患者さんの経過を時系列で整理したものです。
症状や経過には個人差があり、同様の経過や結果を保証するものではありません。