

乳児期のステロイド使用後に浸出症状を経て顔症状が目立ちにくくなった幼児アトピーの経過 (2 歳 男児)

症例 ID：001-02-MR | 記録日：2016 年 9 月 15 日

1. 診断・治療前経過

生後 3 か月頃から顔に湿疹が出て、4 か月頃には両頬から汁が出るほどになり、手足や全身の乾燥もみられました。5 か月頃からリンデロン軟膏などのステロイド外用を受け、一時的に皮膚は整いましたが、中止すると再び痒がり浸出を伴う状態に戻りました。

2. ステロイド使用歴

項目	内容
使用内容	乳児期にリンデロン軟膏などを外用しました。
製品名	リンデロン軟膏など。
強度	不明です。
使用期間	5 か月頃から約 3 か月使用しました。
中止時期	松本医院受診前に中止しました。
来院前／後	来院前に使用歴があります。来院後は使用していません。

3. 治療開始後の経過（リバウンドを含む）

時期	治療開始から	経過
生後 3 か月	発症	顔に湿疹が出始めました。
生後 4 か月	悪化	両頬から浸出液が出て、手足を掻くようになりました。
生後 5～7 か月	外用治療	ステロイド外用で一時的に整いましたが、中止すると再燃しました。
生後 8 か月	治療開始	松本医院を受診し、漢方入浴、外用処置、煎じ薬を開始しました。
治療開始直後	リバウンド	全身の赤み、頬や手足の浸出、夜間の強い掻破がみられました。
治療 1～2 か月	経過中	浸出や赤みの波を繰り返しながら治療を続けました。
2016 年 3 月	変化	顔の湿疹はほとんど目立たなくなりました。
2016 年 8 月	記録時点	手足に症状を残しながら治療を継続していました。

4. ピーク時期

ピークは、ステロイド中止後から治療開始初期にかけて、顔・手足から血や浸出液が出て夜眠りにくかった時期です。

5. 困りごと

- ・夜間のかゆみで眠りにくい状態が続きました。
- ・薬が手や口、目に入らないかを家族が気にしながら処置しました。
- ・遠方から実家を經由して受診する必要がありました。

6. 検査値・写真・画像 ※治療前後の比較ではなく、経過中にみられた症状や検査値の記録として掲載しています。



経過中の画像記録。



経過中の画像記録。



経過中の画像記録。



経過中の画像記録。



経過中の画像記録。



経過中の画像記録。



経過中の画像記録。



経過中の画像記録。



経過中の画像記録。



経過中の画像記録。



経過中の画像記録。



経過中の画像記録。



経過中の画像記録。



経過中の画像記録。



経過中の画像記録。



経過中の画像記録。



経過中の画像記録。



経過中の画像記録。



経過中の画像記録。



経過中の画像記録。



経過中の画像記録。

7. 経過のまとめ

治療開始後は強いリバウンドを経験しましたが、2016 年 3 月には顔の湿疹はほとんど目立たなくなりました。2016 年 8 月時点では手足に症状が残り、治療を継続していました。

本ページは、患者さんの経過を時系列で整理したものです。
症状や経過には個人差があり、同様の経過や結果を保証するものではありません。