

生後3か月の顔面湿疹と短期ステロイド使用後に約2か月で皮膚が整った乳児アトピーの経過 (2歳乳幼児)

症例 ID：001-02-ST | 記録日：2015年6月16日

1. 診断・治療前経過

生後3か月頃、頬から顔全体へ赤い丘疹が広がりました。近医でステロイド外用薬を処方され、約2週間使用しました。塗布直後は軽減しましたが、短期間で再燃し、以前より強い顔面症状となったため治療を開始しました。

2. ステロイド使用歴

項目	内容
使用内容	顔面にステロイド外用薬を使用しました。
製品名	不明です。
強度	不明です。
使用期間	合計約2週間です。
中止時期	2013年5月頃です。
来院前／後	来院前に短期使用歴があります。来院後は使用していません。

3. 治療開始後の経過（リバウンドを含む）

時期	治療開始から	経過
生後3か月頃	発症	頬の赤い丘疹が顔全体へ広がりました。
2013年5月頃	治療開始	濃く煎じた漢方入浴剤をガーゼで顔へ当てる処置を開始しました。
開始数日	一時軽減	赤みとかゆみが減り、皮膚が乾いた状態となりました。
その後	症状の強い時期	一時的に顔面の赤みと湿疹が強くなりました。
開始約3週間	回復傾向	顔面症状が急速に軽減し始めました。
開始約1か月	大きな変化	見た目にも皮膚が大きく整いました。
開始約2か月	経過後	処置回数を減らし、皮膚症状がみられなくなりました。
2歳時	長期経過	再燃はなく、滑らかな皮膚状態を維持していました。


4. ピーク時期

ピークは、治療開始後に一時的に顔面の赤みと湿疹が強くなった時期です。

5. 困りごと

- 顔面のかゆみで昼夜に泣く状態がありました。
- 乳児の顔へ毎日40分程度の処置を繰り返す必要がありました。

6. 検査値・写真・画像 ※治療前後の比較ではなく、経過中にみられた症状や検査値の記録として掲載しています。



2013 年 5 月 8 日の顔面。



2013 年 5 月 11 日の顔面。




2013 年 5 月 16 日の顔面。



2013 年 5 月 17 日の顔面。



2013 年 5 月 24 日の顔面。




2013 年 5 月 29 日の顔面。



2013 年 6 月 1 日の顔面。



2013 年 6 月 2 日の顔面。



2013 年 6 月 7 日の顔面。

7. 経過のまとめ

治療開始約 3 週間後から急速に改善し、約 2 か月後には皮膚症状がみられなくなりました。
2 歳時まで再燃はなく、滑らかな皮膚状態を維持していました。

本ページは、患者さんの経過を時系列で整理したものです。
症状や経過には個人差があり、同様の経過や結果を保証するものではありません。