

治療開始後 10 か月にわたり全身の赤みとかゆみが続いた小児アトピーの経過 (8 歳 小児)

症例 ID：001-08-NR | 記録日：不明

1. 診断・治療前経過

治療開始前は朝夕にステロイド外用が必要な状態でした。2001 年 8 月 7 日に松本医院で治療を開始しました。

2. ステロイド使用歴

項目	内容
使用内容	治療開始前は朝夕にステロイド外用薬を使用していました。
製品名	不明です。
強度	不明です。
使用期間	不明です。
中止時期	2001 年 8 月 7 日の治療開始時です。
来院前／後	来院前に使用歴があります。来院後は使用していません。

3. 治療開始後の経過（リバウンドを含む）

時期	治療開始から	経過
2001 年 8 月 7 日	治療開始	ステロイドを中止し、治療を開始しました。
開始 1～3 か月	強い落屑	全身の赤みとかゆみがあり、落屑量が多い状態でした。
開始 4 か月半	経過中	夜間のかゆみが強いものの、皮膚が少しずつ柔らかくなりました。
開始 6 か月	変化	全身の赤みがやや軽減し、本人の負担も少し減りました。
開始 7～8 か月	症状の波	深夜から明け方にかゆみが強く、蕁麻疹も出ました。
開始 10 か月	経過中	汗でかゆみが強くなる一方、背部や全身の赤みは少しずつ軽減していました。

4. ピーク時期

ピークは、治療開始 1～3 か月に全身の赤みとかゆみが強く、落屑量が多かった時期です。

5. 困りごと

- 夜中の 2 時から 5 時頃にかゆみが強く、家族が長時間背中を掻く必要がありました。
- 全身の赤みと落屑が長期間続きました。

6. 経過のまとめ

治療開始後 10 か月まで全身の赤みとかゆみに波がありましたが、皮膚は少しずつ柔らかくなり、背部や全身の赤みも軽減していました。

本ページは、患者さんの経過を時系列で整理したものです。
症状や経過には個人差があり、同様の経過や結果を保証するものではありません。