

手指の水疱と全身関節部の発疹を経て水疱がほぼ消失した小児アトピーの経過 (10 歳 女兒)

症例 ID：001-10-MH3 | 記録日：2017 年 8 月 18 日

1. 診断・治療前経過

5 歳春から手指に水疱が繰り返し出ました。5 歳 8 月には 40 度を超える高熱後、手足の関節に多数の水疱と赤い腫れが出て、強いステロイド内服薬を使用しました。

その後も体の各部に水疱が出て、痛みとかゆみが続きました。

2. ステロイド使用歴

項目	内容
使用内容	高熱後の全身発疹に強いステロイド内服薬を使用し、他にも複数の内服薬・外用薬を使用しました。
製品名	不明です。
強度	強い内服薬の使用歴があります。
使用期間	5 歳頃から 8 歳頃まで断続的に使用しました。
中止時期	松本医院での治療開始時です。
来院前／後	来院前に使用歴があります。来院後は使用していません。

3. 治療開始後の経過（リバウンドを含む）

時期	治療開始から	経過
5 歳春	発症	手指に水疱が現れては潰れる状態が始まりました。
5 歳 8 月	急性悪化	40 度を超える高熱後、手足の関節に水疱と赤い腫れが出ました。
その後	反復経過	体の各部に水疱が出て、痛みとかゆみが続きました。
8 歳頃	治療開始	煎じ薬と外用処置を開始しました。
治療開始 3 日	一時的変化	水疱がいったん減りました。
治療 1 週間頃	リバウンド	水疱が急激に悪化しました。
治療 2 か月頃	改善期	水疱が急速に減り始めました。
記録時点	経過後	皮膚表面の水疱はほとんどみられなくなりました。

4. ピーク時期


ピークは、5 歳 8 月に 40 度を超える高熱後、手足の関節に多数の水疱が出て赤く腫れた時期と、治療開始 1 週間後の再悪化時です。

5. 困りごと


- 水疱が潰れる痛みとかゆみで、本人のいら立ちが続きました。
- 口腔過敏があり、苦い煎じ薬を飲むことが大きな負担でした。
- 発達障害による食事の制限もあり、治療継続に家族の支援が必要でした。

6. 検査値・写真・画像 ※治療前後の比較ではなく、経過中にみられた症状や検査値の記録として掲載しています。


検査値グラフ




経過中の検査値の推移。




経過中の検査値の推移。




経過中の検査値の推移。



経過中の検査値の推移。




経過中の検査値の推移。



経過中の検査値の推移。




経過中の検査値の推移。



経過中の検査値の推移。



経過中の検査値の推移。



経過中の検査値の推移。

7. 経過のまとめ

治療2か月頃から水疱が急速に減り、記録時点では皮膚表面の水疱はほとんどみられなくなりました。

本ページは、患者さんの経過を時系列で整理したものです。
症状や経過には個人差があり、同様の経過や結果を保証するものではありません。