

結婚後の顔・全身症状と発熱を経て化粧や外出が可能になった成人アトピーの経過 (28 歳女性)

症例 ID：001-20-KEri | 記録日：不明

1. 診断・治療前経過

結婚後、顔、首、足、背中に発疹とかゆみが出て、ステロイドを使用していました。次第にステロイドを塗っても変化が乏しくなり、症状が広がりました。

知人の紹介で松本医院を受診され、治療を開始しました。

2. ステロイド使用歴

項目	内容
使用内容	顔、首、足、背中の症状にステロイド外用薬を使用しました。
製品名	不明です。
強度	不明です。
使用期間	結婚後の症状出現から受診までです。
中止時期	松本医院受診時に中止しました。
来院前／後	来院前に使用歴があります。来院後の使用は不明です。

3. 治療開始後の経過（リバウンドを含む）

時期	治療開始から	経過
結婚後	来院前	顔、首、足、背中に発疹とかゆみが出て、ステロイドを使用しました。
治療開始後 1 週間	初期悪化	発疹が目立ち、全身が赤く腫れ、発熱のため 1 週間仕事を休みました。
開始後 1～2 か月	ピーク	顔の腫れと赤み、夜間の全身のかゆみ、落屑が続きました。
開始後約 3 か月	回復傾向	顔の赤みが出たり引いたりした後、以前の顔に近い状態へ戻りました。
開始後約 5 か月	経過後	体の落屑が減り、皮膚が滑らかになってきました。
初診から 1 年	生活変化	化粧とストッキングの着用が可能となり、追記時にはアトピー症状はみられず、妊娠していました。

4. ピーク時期

ピークは、治療開始後 1～2 か月に、顔と全身が赤く腫れ、発熱、夜間の強いかゆみ、落屑が重なった時期です。

5. 困りごと

- 発熱と全身症状のため 1 週間仕事を休みました。
- 夜間のかゆみで眠れず、家族の介助が必要でした。
- 顔の腫れと赤みにより、化粧や外出が難しい時期がありました。

6. 経過のまとめ

治療開始後は発熱、顔と全身の腫れ、強いかゆみ、落屑を経験しましたが、約 3 か月で顔が以前に近い状態となり、約 5 か月で体の皮膚も滑らかになってきました。

初診から 1 年時点では化粧やストッキングの着用が可能となり、追記時にはアトピー症状はみられず、妊娠中の生活を送っていました。

本ページは、患者さんの経過を時系列で整理したものです。
症状や経過には個人差があり、同様の経過や結果を保証するものではありません。