

手湿疹の完治後に水仕事で再発し再治療を開始した成人アトピーの経過 (26 歳 成人)

症例 ID：001-20-MM5 | 記録日：2017 年 4 月 15 日

1. 診断・治療前経過

2012 年 4 月、水仕事をきっかけに右手中指のひび割れと水疱が出て、全ての指や手の甲へ広がりました。

2. ステロイド使用歴

項目	内容
使用内容	ステロイド使用歴の詳細は不明です。
製品名	不明です。
強度	不明です。
使用期間	不明です。
中止時期	不明です。
来院前／後	来院前に使用歴があります。来院後の使用は不明です。

3. 治療開始後の経過（リバウンドを含む）

時期	治療開始から	経過
2012 年 4 月	発症	右手中指のひび割れと水疱から始まり、手全体へ広がりました。
2012 年 5 月	治療開始	煎じ薬と外用処置を開始しました。
治療翌日以降	症状の強い時期	かゆみが増し、赤いぶつぶつが腕の方へ上がりました。
治療中	浸出・疼痛	手全体にヘルペス様のピリピリした痛みがあり、浸出液で手袋が濡れました。
治療 2 週間	変化	かゆみがなくなり、手が日ごとにきれいになりました。
4 年間	経過後	素手で生活できる快適な状態が続きました。
結婚後	再発	水仕事が増え、右手に湿疹が再発しました。
記録時点	再治療開始	再び漢方治療を開始する段階でした。

4. ピーク時期

ピークは、治療開始直後に手全体の強いかゆみ、浸出、ピリピリした痛みがあり、手袋が濡れるほどだった時期です。

5. 困りごと

- かゆみで眠りにくい日がありました。
- 浸出液で手袋を夜中に交換する必要がありました。

6. 検査値・写真・画像 ※治療前後の比較ではなく、経過中にみられた症状や検査値の記録として掲載しています。



経過中の画像記録。



経過中の画像記録。



経過中の画像記録。



経過中の画像記録。

7. 経過のまとめ

治療開始から2週間ほどでかゆみが軽減し、手の状態が改善しました。

本ページは、患者さんの経過を時系列で整理したものです。
症状や経過には個人差があり、同様の経過や結果を保証するものではありません。