

長期治療中に IgE 値が低下し皮膚症状が残る成人アトピーの経過 (36 歳 成人)

症例 ID：001-30-KM10

記録日：2017 年 1 月 7 日

1. 診断・治療前経過

2011 年 11 月からアトピー治療を開始しました。治療前の症状部位や生活上の支障については不明です。

記録時点では皮膚のかゆみが残り、治療を継続していました。

2. ステロイド使用歴

項目	内容
使用内容	ステロイド使用歴の詳細は不明です。
製品名	不明です。
強度	不明です。
使用期間	不明です。
中止時期	不明です。
来院前／後	不明です。

3. 治療開始後の経過（リバウンドを含む）

時期	治療開始から	経過
2011 年 11 月	治療開始	松本医院で治療を開始されました。
治療継続中	検査経過	総 IgE およびスギ特異的 IgE の推移を定期的に確認しました。
2017 年 1 月	記録時点	かゆみは残っていましたが、IgE 値は低下傾向となっていました。

4. ピーク時期

症状のピーク時期は不明です。


5. 困りごと

・皮膚のかゆみが残り、長期の治療継続が必要でした。

6. 検査値・写真・画像 ※治療前後の比較ではなく、経過中にみられた症状や検査値の記録として掲載しています。



経過中の検査値の推移。



経過中の検査値の推移。

7. 経過のまとめ

2011 年 11 月から治療を続け、2017 年 1 月時点ではかゆみが残るものの、総 IgE とスギ特異的 IgE は低下傾向となっていました。

本ページは、患者さんの経過を時系列で整理したものです。
 症状や経過には個人差があり、同様の経過や結果を保証するものではありません。