

顔から全身へ広がった浸出症状を経て3か月で落ち着いた成人アトピーの経過 (39歳 成人)

症例 ID：001-30-OM2 | 記録日：2015年5月6日

1. 診断・治療前経過

10代後半と20代半ばに強い症状があり、複数の医療機関でステロイドを使用しました。
2014年2月に鼻周囲、額、耳周囲から再発し、目周囲まで広がりました。

2. ステロイド使用歴

項目	内容
使用内容	過去の強い症状時にステロイドを使用しました。
製品名	製品名は不明です。
強度	不明です。
使用期間	10代後半および20代半ばに使用しました。
中止時期	2014年3月の治療開始前です。
来院前／後	来院前に使用歴があります。来院後は使用していません。

3. 治療開始後の経過（リバウンドを含む）

時期	治療開始から	経過
2014年2月20日	再発	鼻周囲、額、耳周囲から目周囲へ広がりました。
2014年3月11日	治療開始	煎じ薬と外用処置を開始しました。
治療初期	症状の強い時期	全身から浸出液が出て、目、耳、首、胸、腕に腫れとむくみがみられました。
同時期	生活への影響	かゆみと痛みで眠れず、深夜に入浴する日が続きました。
約3か月後	経過後	症状は落ち着きました。

4. ピーク時期

ピークは、治療初期に全身から浸出液が出て、目、耳、首、胸、腕の腫れとむくみ、不眠が重なった時期です。

5. 困りごと

- 昼夜を問わない浸出液とかゆみ、痛みで睡眠が妨げられました。
- 漢方入浴を最長4時間半行う日があり、家族の支援が必要でした。

6. 経過のまとめ

治療初期の全身浸出症状を経て、約3か月後には症状が落ち着きました。

本ページは、患者さんの経過を時系列で整理したものです。
症状や経過には個人差があり、同様の経過や結果を保証するものではありません。