

背部・臀部の強いかゆみと浸出症状を経て皮膚状態が整った成人アトピーの経過 (30 歳 男性)

症例 ID：001-30-T3 | 記録日：2001 年 10 月 7 日

1. 診断・治療前経過

小児期から湿疹があり、フルコートなどの外用薬を使用しました。高校期以降も複数の医療機関で皮膚症状に対する治療を受けました。

2000 年 4 月頃から強いかゆみが出て、同年 6 月末に松本医院を受診されました。

2. ステロイド使用歴

項目	内容
使用内容	小児期からステロイド外用薬を使用しました。
製品名	フルコート。その他は不明です。
強度	不明です。
使用期間	小児期から 2000 年の治療変更前まで断続的に使用しました。
中止時期	松本医院での治療開始時期です。
来院前／後	来院前に使用歴があります。来院後は使用していません。

3. 治療開始後の経過（リバウンドを含む）

時期	治療開始から	経過
小児期～高校期	反復経過	湿疹が出るたびに外用薬を使用しました。
2000 年 4 月頃	急性悪化	原因不明の強いかゆみが出ました。
2000 年 6 月末	治療開始	松本医院を受診し、従来薬を中止して治療を開始しました。
治療初期	ピーク	背部と臀部下方のかゆみが強く、掻破部から大量の浸出液が出ました。
2001 年 10 月	経過後	皮膚症状は大きく軽減し、皮膚状態も整いました。

4. ピーク時期

ピークは、臀部下方を掻いた後に浸出液が止まらず衣類まで濡れ、運転中も強いかゆみで集中できなかった時期です。

5. 困りごと

- 仕事後の運転中にも強いかゆみがあり、安全な運転が難しい時期がありました。
- 背部と臀部からの浸出液で衣類が汚れました。

6. 経過のまとめ

治療開始から約 1 年 4 か月後には、アトピー症状が大きく軽減し、皮膚もきれいな状態となりました。

本ページは、患者さんの経過を時系列で整理したものです。
症状や経過には個人差があり、同様の経過や結果を保証するものではありません。