

治療中断後の再燃を経て仕事と結婚生活を続けられるようになった成人アトピーの経過 (41 歳 男性)

症例 ID：001-40-KR2

記録日：2017 年 1 月 20 日

1. 診断・治療前経過

生後まもなくから約 40 年間、アトピー症状が続き、初回受診前にはステロイドを使用していました。

約 20 年前に治療を開始して症状が大きく軽減しましたが、治療費などを理由に通院を中断し、約 10 年後に強いかゆみが再燃しました。

2. ステロイド使用歴

項目	内容
使用内容	初回治療前にステロイドを使用していました。
製品名	不明です。
強度	不明です。
使用期間	不明です。
中止時期	約 20 年前の初回治療開始時です。
来院前／後	初回治療前に使用歴があります。治療開始後は使用していません。

3. 治療開始後の経過（リバウンドを含む）

時期	治療開始から	経過
約 20 年前	初回治療開始	ステロイドを中止して治療を開始しました。
開始後約 1 か月	強いリバウンド	強いかゆみで夜も眠れない状態が続きました。
開始後半年～1 年	大幅な変化	強い症状がほとんどみられなくなりました。
その後	治療中断	症状が軽減したため通院を中断しました。
中断約 10 年後	再燃・再受診	強いかゆみが再び出て治療を再開しました。
再治療約 10 年後	記録時点	初回再燃時と比べて大幅に軽減し、主に煎じ薬を続けながら生活していました。


4. ピーク時期

ピークは、初回治療開始後約 1 か月間、強いかゆみで夜も眠れなかった時期です。


5. 困りごと

- 強いかゆみで夜間に眠れない状態が続きました。
- 症状が軽減した後に治療を中断し、約 10 年後に再燃しました。


6. 検査値・写真・画像 ※治療前後の比較ではなく、経過中にみられた症状や検査値の記録として掲載しています。




治療再開後の検査値の推移。




治療再開後の検査値の推移。




治療再開後の検査値の推移。



治療再開後の検査値の推移。



治療再開後の検査値の推移。



治療再開後の検査値の推移。

7. 経過のまとめ

再治療を続け、記録時点では初回再燃時と比べて大幅に症状が軽減していました。
普通に仕事を続け、結婚生活を送りながら、主に煎じ薬で治療を継続していました。

本ページは、患者さんの経過を時系列で整理したものです。
症状や経過には個人差があり、同様の経過や結果を保証するものではありません。