

長期ステロイド使用後の再燃と二次感染を経て治療を再開した成人アトピーの経過 (49 歳 成人)

症例 ID：001-40-NS3 | 記録日：2018 年 5 月 24 日

1. 診断・治療前経過

約 20 年前に顔のかゆみでステロイド外用・内服を開始しました。薬剤中止後に強く悪化し、数か月で一度落ち着きました。約 2 年後に顔と首へ再燃し、松本医院で治療して約 4 か月で職場復帰しました。その後 17 年ほど比較的軽い状態で過ごしました。

2. ステロイド使用歴

項目	内容
使用内容	ステロイド外用薬と内服薬を使用しました。幼少期にはフルコートを使用した記憶があります。
製品名	フルコート、ほか不明です。
強度	不明です。
使用期間	約 20 年前から断続的に使用しました。
中止時期	初回の松本医院受診前です。
来院前／後	来院前に使用歴があります。来院後は使用していません。

3. 治療開始後の経過（リバウンドを含む）

時期	治療開始から	経過
約 20 年前	初回症状	顔のかゆみに外用・内服ステロイドを使用しました。
薬剤中止後	強い悪化	人前に出られないほど悪化しましたが、数か月で軽減しました。
約 2 年後	再燃・初回治療	顔と首へ再燃し、松本医院で治療を開始しました。
約 4 か月後	職場復帰	皮膚症状が軽減し、職場へ復帰しました。
その後約 17 年	比較的安定	時折症状はありましたが、軽い状態で生活しました。
前年 7 月～秋	再燃	顔から上半身へ広がり、夜間のかゆみと不眠が出ました。
記録年	二次感染・再受診	掻破部の二次感染で顔が著しく腫れ、治療を再開しました。


4. ピーク時期

ピークは、再燃後に二次感染を起こし、顔が著しく腫れて人前に出にくい状態となった時期です。


5. 困りごと

- ・夜間の強いかゆみで熟睡できませんでした。
- ・上半身へ症状が広がり、重い衣類の刺激にも耐えにくくなりました。
- ・二次感染による顔面腫脹がありました。



6. 検査値・写真・画像 ※治療前後の比較ではなく、経過中にみられた症状や検査値の記録として掲載しています。



経過中の検査値の推移。



経過中の検査値の推移。



経過中の検査値の推移。

経過中の検査値の推移。

7. 経過のまとめ

過去の初回治療時には約 4 か月で職場復帰でき、その後約 17 年間は比較的軽い状態で生活しました。
記録時点では再燃と二次感染により治療を再開していましたが、通院経過の中で、皮膚状態や生活面に前向きな変化がみられた症例です。

本ページは、患者さんの経過を時系列で整理したものです。
症状や経過には個人差があり、同様の経過や結果を保証するものではありません。