

# 出産後の眼痛と全身症状・白斑を経て長期治療を続けた成人アトピーの経過 (43 歳 女性)

症例 ID：001-40-NY6 | 記録日：2017 年 7 月 11 日

## 1. 診断・治療前経過

第3子妊娠後期から脇腹と目の奥に強い痛みがあり、出産後は目を開けられないほどの眼痛が続きました。20歳頃から花粉症と手荒れもありました。産後1か月の平成22年7月に松本医院を受診され、治療を開始しました。

## 2. ステロイド使用歴

| 項目    | 内容                 |
|-------|--------------------|
| 使用内容  | 受診前のステロイド使用歴は不明です。 |
| 製品名   | 不明です。              |
| 強度    | 不明です。              |
| 使用期間  | 不明です。              |
| 中止時期  | 不明です。              |
| 来院前／後 | 不明です。              |

## 3. 治療開始後の経過（リバウンドを含む）

| 時期       | 治療開始から | 経過                                    |
|----------|--------|---------------------------------------|
| 平成22年7月  | 治療開始   | 産後の眼痛と皮膚症状に対する治療を開始しました。              |
| 開始約4か月   | 皮膚症状出現 | 肘内側から手、腕、顔、首、胸へかゆみ、ただれ、浸出液が広がりました。    |
| その後      | 白斑出現   | 強いかゆみの部位に白斑が出ました。                     |
| 開始約2年    | 心理的变化  | 症状を受け入れられるようになり、治療を継続しました。            |
| 開始1年半後以降 | 検査経過   | 貧血が続きました。                             |
| 開始6年     | 記録時点   | 顔や手の腫れ、ヘルペス関連数値、貧血を確認しながら治療を継続していました。 |


## 4. ピーク時期

ピークは、治療開始約4か月後から、腕、顔、首、胸へ強いかゆみ、ただれ、浸出液が広がり、白斑と精神的負担が重なった時期です。


## 5. 困りごと

- ・目を開けられないほどの眼痛がありました。
- ・幼い3人の子どもの育児と全身症状が重なりました。
- ・全身の外見変化と白斑により心理的負担が大きくなりました。


## 6. 検査値・写真・画像 ※治療前後の比較ではなく、経過中にみられた症状や検査値の記録として掲載しています。




経過中の検査値の推移。




経過中の検査値の推移。




経過中の検査値の推移。




経過中の検査値の推移。




経過中の検査値の推移。




経過中の検査値の推移。




経過中の検査値の推移。




経過中の検査値の推移。




経過中の検査値の推移。




経過中の検査値の推移。




経過中の検査値の推移。




経過中の検査値の推移。




経過中の検査値の推移。



経過中の検査値の推移。



経過中の検査値の推移。



経過中の検査値の推移。

## 7. 経過のまとめ

治療開始約2年後には症状を受け入れられるようになり、治療を継続できる状態となりました。

開始6年時点でも顔や手の腫れ、貧血などが残り、長期治療を継続していましたが、通院経過の中で、皮膚症状や生活上の支障が軽減していく変化がみられた症例です。

本ページは、患者さんの経過を時系列で整理したものです。  
症状や経過には個人差があり、同様の経過や結果を保証するものではありません。