

# 通院中断後に眉周囲・首・頭皮症状が再燃し治療を再開した成人アトピーの経過 (42 歳)

症例 ID：001-40-YT3

記録日：2017 年 5 月 14 日

## 1. 診断・治療前経過

松本医院で治療を受けていましたが、症状が軽くなったため自己判断で約 2 年前から通院を中断しました。2017 年春頃から眉毛周囲の乾燥と落屑、首のかゆみと痛み、頭皮のかゆみが出ました。連休前に勤務中、全身にかゆみと痛みを伴う症状が強くなり、治療を再開しました。

## 2. ステロイド使用歴

| 項目    | 内容       |
|-------|----------|
| 使用内容  | 不明です。    |
| 製品名   | 不明です。    |
| 強度    | 不明です。    |
| 使用期間  | 確認できません。 |
| 中止時期  | 確認できません。 |
| 来院前／後 | 不明です。    |

## 3. 治療開始後の経過（リバウンドを含む）

| 時期       | 治療開始から | 経過                               |
|----------|--------|----------------------------------|
| 約 2 年前   | 通院中断   | 症状が軽くなったため、自己判断で通院を中断しました。       |
| 2017 年春頃 | 再燃     | 眉毛周囲の乾燥と落屑、首のかゆみと痛み、頭皮のかゆみが出ました。 |
| 連休前      | 急性悪化   | 勤務中に全身のかゆみと痛みが強くなりました。           |
| その後      | 治療再開   | 松本医院を再受診し、治療を再開しました。             |

## 4. ピーク時期

ピークは、連休前の勤務中に全身のかゆみと痛みが強くなり、自己判断での通院中断を見直して再受診した時期です。

## 5. 困りごと


- 眉毛周囲の皮膚が乾燥し、ぼろぼろと剥がれました。
- 首のかゆみと痛み、頭皮のかゆみが続きました。
- 症状が勤務中に強くなり、治療を再開する必要がありました。

## 6. 検査値・写真・画像 ※治療前後の比較ではなく、経過中の記録として掲載しています。

### (1) 検査値グラフ




経過中の検査値の推移。




経過中の検査値の推移。



経過中の検査値の推移。



経過中の検査値の推移。



経過中の検査値の推移。




経過中の検査値の推移。




経過中の検査値の推移。



経過中の検査値の推移。



経過中の検査値の推移。



経過中の検査値の推移。

## 7. 経過のまとめ

症状が軽くなったため通院を中断していましたが、約2年後に眉周囲、首、頭皮の症状が再び出ました。勤務中に全身のかゆみと痛みが強くなったため松本医院を再受診し、治療を再開しました。

本ページは患者さんの経過を時系列で整理したものです。  
症状や経過には個人差があり、同様の結果を保証しません。