

首後部の急性赤斑から再燃を経て治療を再開した成人アトピーの経過
(55 歳 成人)

症例 ID : 001-50-MK5 | 記録日 : 2017 年 9 月 4 日

1. 診断・治療前経過

2015 年 10 月、首の後ろに赤斑が複数出て、松本医院を受診されました。これまで複数の病院でステロイド剤を処方されてきた経過があり、治療開始後に首後部から顔面へ症状が広がりました。

2. ステロイド使用歴

項目	内容
使用内容	過去に複数の病院でステロイド剤を処方されていました。
製品名	不明です。
強度	不明です。
使用期間	不明です。
中止時期	松本医院での治療開始時期です。
来院前／後	来院前に使用歴があります。来院後は使用していません。

3. 治療開始後の経過（リバウンドを含む）

時期	治療開始から	経過
2015 年 10 月	発症・受診	首の後ろに赤斑が出て松本医院を受診しました。
治療開始後数日	悪化	首後部から顔面へ症状が広がり、微熱、痛痒さ、皮膚の腫れが出ました。
治療開始～3 か月	症状の強い時期	首と顔を中心に強い症状が続きました。
約 3 か月後	軽減	見た目の症状はほとんどなくなりました。
約 7 か月後	治療終了	血液検査後、再発時の再治療を条件に一旦治療を終了しました。
約 1 年後	再発	お盆明け頃から突然再発し、再治療を開始しました。


4. ピーク時期

ピークは、治療開始から約 3 か月の間、首後部から顔面へ症状が広がり、微熱、痛痒さ、皮膚の腫れがみられた時期です。


5. 困りごと

- ・顔面まで症状が広がり、外見面と生活面の負担がありました。
- ・煎じ薬や外用処置など、日々の治療に時間と手間がかかりました。
- ・一旦落ち着いた後も再発し、再治療が必要になりました。


6. 検査値・写真・画像 ※治療前後の比較ではなく、経過中にみられた症状や検査値の記録として掲載しています。




経過中の画像記録。




経過中の画像記録。




経過中の画像記録。




経過中の画像記録。




経過中の画像記録。



経過中の画像記録。



経過中の画像記録。



経過中の画像記録。

7. 経過のまとめ

治療開始から約3か月後には見た目の症状はほとんどなくなり、約7か月後に一旦治療を終了しました。

本ページは、患者さんの経過を時系列で整理したものです。
症状や経過には個人差があり、同様の経過や結果を保証するものではありません。