

# 顔面の赤み・腫れとかゆみを経て3か月でかゆみが消失した成人アトピーの経過 (52歳 成人)

症例 ID：001-50-TM | 記録日：2014年9月30日

## 1. 診断・治療前経過

記録年の初め頃、額、眼周囲、こめかみ、頬、首に急なかゆみが出ました。皮膚科でパッチテストを受け、ステロイド外用と内服薬を使用しました。

薬を中止するとさらに悪化し、赤く腫れた顔を眼鏡とマスクで隠して通勤する状態が約5か月続きました。

## 2. ステロイド使用歴

| 項目    | 内容                              |
|-------|---------------------------------|
| 使用内容  | 顔面症状にステロイド外用薬を数回使用し、内服薬も服用しました。 |
| 製品名   | 不明です。                           |
| 強度    | 不明です。                           |
| 使用期間  | 発症後約5か月の間に断続的に使用しました。           |
| 中止時期  | 松本医院での治療開始時期です。                 |
| 来院前／後 | 来院前に使用歴があります。来院後は使用していません。      |

## 3. 治療開始後の経過（リバウンドを含む）

| 時期     | 治療開始から | 経過                               |
|--------|--------|----------------------------------|
| 記録年初め頃 | 発症     | 顔と首に強いかゆみが出ました。                  |
| 他院治療期  | 反復悪化   | 外用薬で一時軽減しましたが、中止後に赤みと腫れが強くなりました。 |
| 約5か月後  | 治療開始   | 松本医院を受診し、煎じ薬と外用処置を開始しました。        |
| 治療初期   | 症状の波   | 倦怠感と顔面腫脹が一時的にみられました。             |
| 治療3か月  | 経過後    | 顔のかゆみがみられなくなりました。                |

## 4. ピーク時期

ピークは、顔面が赤く腫れ、眼鏡とマスクで隠して会社へ通い、かゆみでいら立ちが続いた時期です。

## 5. 困りごと

- 顔面症状のため外出と対人場面が負担となりました。
- かゆみにより仕事でも不快感が続きました。

## 6. 経過のまとめ

治療開始から3か月後には、顔のかゆみがみられなくなりました。

本ページは、患者さんの経過を時系列で整理したものです。  
症状や経過には個人差があり、同様の経過や結果を保証するものではありません。