

長年の手湿疹治療中断後に全身症状が再燃し治療を再開した成人アトピーの経過 (67 歳 女性)

症例 ID：001-60-KK6 | 記録日：2017 年 5 月 12 日

1. 診断・治療前経過

20 代頃から手荒れが始まり、結婚・出産後の家事で悪化しました。主婦湿疹としてステロイド外用を続け、手掌が赤く薄くなりました。1998 年 3 月に松本医院を受診し、手症状は軽減しましたが、家族の介護により治療を中断しました。

2. ステロイド使用歴

項目	内容
使用内容	主婦湿疹にステロイド外用薬を使用しました。
製品名	不明です。
強度	不明です。
使用期間	20 代頃から 1998 年頃まで長期に使用しました。
中止時期	1998 年 3 月頃です。
来院前／後	来院前に長期使用歴があります。来院後は使用していません。

3. 治療開始後の経過（リバウンドを含む）

時期	治療開始から	経過
20 代～	手湿疹	手指の乾燥と荒れが進み、ステロイド外用を続けました。
1998 年 3 月	初回治療	松本医院を受診し、手症状は次第に軽減しました。
その後	治療中断	父母の介護により受診が途切れしました。
2017 年 3 月頃	再燃	全身のピリピリした痛み、両腕のかゆみ、両足の赤紫色の湿疹が出ました。
2017 年 5 月 6 日	治療再開	漢方入浴、煎じ薬、抗ウイルス薬による治療を再開しました。
2017 年 5 月 12 日	経過中	症状が少しずつ落ち着いていました。

4. ピーク時期

ピークは、2017 年 3 月頃に全身のピリピリする痛み、両腕のかゆみ、両足の赤紫色の湿疹が重なった時期です。

5. 困りごと

- 長年の介護により、自身の治療を後回しにする状態が続きました。
- 全身の痛みとかゆみがあり、介護生活との両立が負担となりました。

6. 経過のまとめ

2017 年 5 月 6 日に治療を再開し、記録時点では全身の痛み、腕のかゆみ、両足の湿疹が少しずつ落ち着いていました。

本ページは、患者さんの経過を時系列で整理したものです。
症状や経過には個人差があり、同様の経過や結果を保証するものではありません。