

# 上腕・胸部から広がった反復症状が2回の受診後にみられなくなった成人アトピーの経過 (62歳男性)

症例 ID：001-60-NT | 記録日：2015年12月2日

## 1. 診断・治療前経過

50代半ばから上腕と胸部に発疹が出て、複数の皮膚科で外用薬を使用しました。約2年間は半年ごとの再燃でしたが、次第に間隔が短くなり、背中から脇腹へ広がりました。松本医院を受診され、漢方外用薬と煎じ薬による治療を受けられました。

## 2. ステロイド使用歴

| 項目    | 内容                                 |
|-------|------------------------------------|
| 使用内容  | 複数の皮膚科で外用薬を使用しました。ステロイド含有の有無は不明です。 |
| 製品名   | 不明です。                              |
| 強度    | 不明です。                              |
| 使用期間  | 50代半ばから数年間、断続的に使用しました。             |
| 中止時期  | 松本医院受診時です。                         |
| 来院前／後 | 来院前に外用薬使用歴があります。来院後の使用は不明です。       |

## 3. 治療開始後の経過（リバウンドを含む）

| 時期     | 治療開始から | 経過                           |
|--------|--------|------------------------------|
| 50代半ば  | 発症     | 上腕と胸部に発疹が出ました。               |
| その後約2年 | 反復     | 外用後に軽減し、半年ほどで再燃する経過を繰り返しました。 |
| その後    | 範囲拡大   | 再燃間隔が短くなり、背中から脇腹へ広がりました。     |
| 初回受診   | 治療開始   | 漢方外用薬と煎じ薬を開始しました。            |
| 2回目受診  | 追加処方   | 検査結果を確認し、追加処方を受けました。         |
| 約3年後   | 経過後    | その後は発疹がみられず、再受診していませんでした。    |

## 4. ピーク時期

ピークは、再燃間隔が短くなり、発疹が背中から脇腹へ広がった時期です。

## 5. 困りごと

- ・発疹とかゆみが繰り返し、複数の医療機関を受診しました。
- ・症状が広がり、外用薬での一時的な対応が続きました。

## 6. 経過のまとめ

松本医院では2回の受診で治療を行い、その後約3年間、発疹はみられませんでした。

症状が落ち着いた後は、皮膚症状を理由とする再受診はありませんでした。

本ページは、患者さんの経過を時系列で整理したものです。  
症状や経過には個人差があり、同様の経過や結果を保証するものではありません。